

# Fiche de suivi de la fonction hépatique sous VALDOXAN®

Si l'élévation des transaminases sériques dépasse 3 fois la limite supérieure des valeurs normales :

- le traitement doit être arrêté, et
- le contrôle doit être répété régulièrement jusqu'à un retour aux valeurs normales.

## VALDOXAN® 25 mg/j

	Instauration à 25 mg/j	3 semaines	6 semaines	12 semaines	24 semaines
	Date : .....	Date : .....	Date : .....	Date : .....	Date : .....
<b>ALAT</b> (U/L)					
<b>ASAT</b> (U/L)					
	Dosages additionnels				
	Date : .....				

Nom du patient : .....


Date de l'instauration : .....

## En cas d'augmentation de la posologie à 50 mg/j, redémarrer le calendrier de contrôles

	Instauration à 50 mg/j	3 semaines	6 semaines	12 semaines	24 semaines
	Date : .....	Date : .....	Date : .....	Date : .....	Date : .....
<b>ALAT</b> (U/L)					
<b>ASAT</b> (U/L)					
	Dosages additionnels				
	Date : .....				

En cas de symptômes ou d'anomalie du bilan hépatique, se référer au dos de cette fiche.

# Conduite à tenir en cas de symptômes ou d'anomalie du bilan hépatique, au cours d'un traitement par Valdoxan.



\* tels que urines foncées, selles décolorées, coloration jaune de la peau / des yeux, douleur dans la partie supérieure droite de l'abdomen, apparition d'une fatigue prolongée et inexplicable